

**アカの病勢は強くなっています！！  
摘採して網を軽くしてください。**

2月12日（旧暦8日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (µg・at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	11.9	18.5	20.3	0.6	●	●	○	25
6(2)号	12	11.5	22.8	1.4	-	●	★	●	35
七つはげ	11	11.7	22.2	1.7	2.7	●	▲	○	15
よりあわせ	A	10.7	18.4	20.3	-	▲	▲	○	12
えどなかつ	2	11.0	20.1	10.3	-	★	●	○	15
にしのかつ	3	11.2	20.9	6.5	2.3	●	●	○	12
たかつ	4	10.8	21.9	3.2	-	○	●	●	8
せいどまり	B	11.2	21.7	5.0	1.9	○	★	●	13
13号	10	11.2	20.9	6.9	-	●	★	●	12
20号	9	11.2	21.7	2.8	1.9	●	▲	●	15
24号	8	11.1	21.9	2.9	-	○	●	●	10
ひやっかん	5	11.4	22.9	1.2	3.1	○	●	●	12
22(1)号	6	11.4	23.0	0.7	-	○	●	★	22
25号	7	11.0	22.1	3.0	1.5	●	●	▲	22
33号	16	11.4	23.1	0.9	-	★	▲	▲	20
43号	13	11.6	23.0	0.8	1.8	★	★	▲	10
43号	14	10.7	22.1	6.0	-	○	●	○	20
44号	15	11.4	22.6	9.6	1.6	●	○	●	35
45号	C	11.4	23.6	1.4	-	★	○	●	18
平均		11.3	21.8	5.5	1.9	13/19地点	17/19地点	13/19地点	17

1 養殖概況

- ・現在5～6回目の摘採が行われています。
- ・前回調査時より、色調に改善が見られています。

2 海況（12日満潮時・右表）

- 水温：平均11.3℃と、平年より1.5℃高めでした。
- 比重：平均21.8でした。
- 栄養塩：平均5.5マイクロ（µg・at/L）でした。
- プランクトン：沈殿量は平均1.9cc/100Lでした。
- 主な種類は珪藻（タラシオネマ、スケルトネマ等）です。

3 ノリの病害・生長など（12日調査）

- ・色落ちは13調査点で確認され、軽度9点、中度3点、重度1点でした。
- ・アカは13調査点で確認され、軽度8点、中度1点、重度4点でした。
- ・ツボは17調査点で確認され、軽度9点、中度4点、重度4点でした。

4 今後の管理

- ・アカ対策のため、摘採可能な網は速やかに摘採し、活性処理を行ってください。
- ・色調の改善が見られた網は、速やかに摘採してください。
- ・網の高さは、ハラで2.3m（吊り口で2.6m）以上とし、乾き具合に応じて、現場で調節を行ってください。

アカ・ツボの感染・色落ちの程度：○：なし、●：軽度、▲：中度、★：重度  
※プランクトン沈殿量は速報値です。