

## 1 養殖概況

現在、8～9回目の摘採が行われています。

## 2 海況（27日満潮時・右表）

水温：平均13.2℃と、平年より3.1℃高めでした。

比重：平均23.0でした。

栄養塩：平均3.8マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（キートセロス、スケルトネマ）でした。

## 3 ノリの病害など（27日調査）

- ・ノリの色調は正常でした。
- ・アカは全調査点で確認され、重度・大量感染が4点、中度が3点、軽度が7点でした。
- ・ツボが44号で初認されました。

## 4 今後の管理

- ・プランクトンの動向次第では、沖で色調が低下する可能性があります。
- ・今度のカラマは干潮位が高いため、アカの大被害が予想されます。
- ・網の高さを3月2日までに、ハラで2.7m（吊り口で3.0m）以上とし、乾き具合に応じて、現場で調節を行ってください。
- ・生産不能な網は、すみやかに撤去してください。
- ・網を新しく張る場合は、3月6,7日が適期です。

本冷の場合、網の高さは、ハラで1.5m（吊り口で1.7m）以上を目安としてください。

## 2月27日（旧暦4日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ( $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ )	プランクトン ( $\text{cc}/100\text{L}$ )	アカ	ツボ	葉長 ( $\text{cm}$ )
4号	1	13.5	19.4	16.0	4.7	▲	○	12
6(2)号	12	13.2	23.4	2.5	-	○	○	8
七つはぜ	11	13.2	23.5	1.8	5.4	▲	○	18
よりあわせ	A	12.5	19.1	17.1	-	●	○	8
えどなかつ	2	13.0	22.9	2.6	-	●	○	20
にしのつ	3	12.6	23.4	3.4	5.4	▲	○	10
たかつ	4	12.9	23.1	1.8	-	★	○	18
せいどまり	B	13.0	22.4	4.8	4.6	★	○	18
13号	10	13.4	23.5	1.5	-	★	○	20
20号	9	13.6	23.5	2.7	9.0	○	○	8
24号	8	13.7	23.6	1.3	-	●	○	15
ひゃっかん	5	13.2	23.3	2.3	10.2	○	○	8
22(1)号	6	13.1	23.4	1.9	-	○	○	15
25号	7	13.3	23.6	1.0	5.6	★	○	15
33号	16	13.2	23.6	1.6	-	●	○	15
43号	13	13.6	23.7	1.1	7.3	●	○	15
43号	14	13.5	23.1	8.7	-	●	○	12
44号	15	13.4	23.8	0.3	6.3	●	●	15
45号	C	13.3	24.0	0.3	-	○	○	10
平均		13.2	23.0	3.8	6.5	14/19地点	1/19地点	14

アカ・ツボの感染程度：○感染なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染  
※プランクトン沈殿量は速報値です