

## 3月2日（旧暦8日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (µg·at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	13.8	11.2	43.3	1.5	○	○	○	10
6(2)号	12	13.9	15.1	26.2	-	○	○	○	10
七つはぜ	11	13.5	20.0	6.9	7.7	●	○	○	8
よりあわせ	A	12.8	10.1	47.8	-	▲	○	○	12
えどなかつ	2	13.1	15.7	27.3	-	●	○	○	10
にしのつ	3	13.2	15.6	25.8	2.6	★	○	●	10
たかつ	4	13.2	20.6	8.2	-	▲	○	○	10
せいどまり	B	12.8	21.1	7.2	7.4	-	-	-	-
13号	10	13.2	18.5	12.2	-	○	○	●	10
20号	9	13.4	20.0	7.8	7.4	○	○	●	5
24号	8	13.4	20.5	3.4	-	○	○	●	8
ひゃっかん	5	13.1	17.1	3.3	14.7	●	○	●	10
22(1)号	6	12.9	23.1	1.8	-	★	○	●	8
25号	7	13.4	22.0	1.4	8.6	○	○	▲	10
33号	16	13.0	23.0	3.0	-	▲	○	●	20
43号	13	13.3	22.5	3.7	8.8	★	○	●	12
43号	14	12.8	21.5	2.1	-	○	○	○	10
44号	15	13.4	22.7	3.1	3.6	●	●	○	5
45号	C	13.3	23.3	1.4	-	○	●	●	8
平均		13.2	19.1	12.4	6.9	10/18地点	2/18地点	10/18地点	10

### 1 養殖概況

現在、9～10回目の摘採が行われています。

### 2 海況（2日満潮時・右表）

水温：平均13.2℃と、平年より2.9℃高めでした。

比重：平均19.1でした。

栄養塩：平均12.3マイクロ（µg·at/L）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（キートセロス）でした。

### 3 ノリの病害など（2日調査）

- ・色落ちは10調査点で確認され、中度1点、軽度9点でした。
- ・アカは10調査点で確認され、重度・大量感染が3点、中度が3点、軽度が4点でした。
- ・ツボは2調査点で確認され、全て軽度でした。

### 4 今後の管理

- ・沖の漁場を中心として色落ちを確認しました。  
ノリの色があるうちに摘採を進めてください。
- ・網の高さをハラで2.7m（吊り口で3.0m）以上とし、  
乾き具合に応じて、現場で調節を行ってください。
- ・生産不能な網は、すみやかに撤去してください。

アカ・ツボの感染・色落ちの程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染  
※プランクトン沈殿量は速報値です